

## 2. Soustavy lineárních rovnic

**Cv. 2.1** Zapište rozšířenou matici soustavy

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= 6, \\ -3x_1 + x_2 &= 2,\end{aligned}$$

a vyřešte soustavu Gaussovou nebo Gaussovou–Jordanovou eliminací.

Znázorněte řešení soustavy graficky jako průsečík přímek (tzv. řádkový pohled). Dále vyjádřete pravou stranu soustavy jako kombinaci sloupců matice soustavy (tzv. sloupcový pohled).


**Řešení:**

Rozšířená matice soustavy je

$$\left( \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ -3 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

Aplikací elementárních řádkových úprav snadno nalezneme řešení  $(x_1, x_2) = (1, 5)$ :

$$\left( \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ -3 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & 20 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{array} \right).$$



Rovnice  $x_1 + x_2 = 6$  a  $-3x_1 + x_2 = 2$  popisují dvě přímky v rovině, řešení soustavy  $(1, 5)$  je jejich průsečíkem.

Sloupce rozšířené matice soustavy můžeme zakreslit jako vektory v rovině. Řešení soustavy pak říká, že vektor pravých stran  $(6, 2)$  dostaneme sečtením (1-krát prodlouženého) vektoru  $(1, -3)$  a 5-krát prodlouženého vektoru  $(1, 1)$ .

**Cv. 2.2** Vyřešte Gaussovou nebo Gaussovou–Jordanovou eliminací následující soustavy rovnic a určete hodnost matic. Na závěr udělejte zkoušku řešení.

$$(a) \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right), \quad (b) \left( \begin{array}{ccc|c} 5 & -3 & 6 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & -1 \end{array} \right), \quad (c) \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \right).$$

### Řešení:

- (a) Aplikací elementárních řádkových úprav převedeme rozšířenou matici soustavy do odstupňovaného tvaru:

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 3 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 2 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -4 \\ 0 & 5 & -10 & -10 \end{array} \sim \\ \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -20 & -30 \end{array}.$$

Zpětnou substitucí získáme jediné řešení soustavy  $(x_1, x_2, x_3) = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$ . Alternativně můžeme také použít Gaussovou–Jordanovu eliminaci a převést matici do redukovaného odstupňovaného tvaru

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \end{array}.$$

Hodnost matice je daná počtem nenulových řádků (počtem pivotů) odstupňovaného tvaru. V tomto případě platí  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b) = 3$ .

Dosazením ověříme, že vektor  $(x_1, x_2, x_3) = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$  opravdu vyhovuje soustavě (ale už neověříme, zda potenciálně neexistuje nějaké další řešení).

- (b) Opět upravíme matici pomocí elementárních řádkových úprav:

$$\begin{array}{ccc|c} 5 & -3 & 6 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & -1 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 5 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & -1 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & 1 & -13 \\ 0 & 7 & 1 & -7 \end{array} \sim \\ \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & 1 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}.$$

Poslední řádek upravené matice reprezentuje rovnici  $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 5$ , soustava tedy nemá řešení.

Vidíme, že se v posledním sloupci upravené matice nachází pivot a hodnost rozšířené matice soustavy je  $\text{rank}(A | b) = 3$ , zatímco  $\text{rank}(A) = 2$ .

- (c) Aplikací elementárních úprav převedeme matici na tvar:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}.$$

Nyní použijeme zpětnou substituci. Z druhého řádku vyjádříme  $x_2 = 3 - 2x_3$ , přičemž volnou proměnnou  $x_3$  ponecháme jako parametr. Nakonec z prvního řádku dostaneme  $x_1 = 1 + x_3$ . Soustava má tedy nekonečně mnoho řešení ve tvaru

$$(x_1, x_2, x_3) = (1 + x_3, 3 - 2x_3, x_3) = (1, 3, 0) + x_3 \cdot (1, -2, 1).$$

Geometricky množina řešení tvoří přímku, která prochází bodem  $(1, 3, 0)$  a má směrnici  $(1, -2, 1)$ .

V tomto případě opět platí  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid b) = 2$ , ale zároveň je  $\text{rank}(A)$  menší než počet proměnných.

Dosazením například pro  $x_3 = 0$  a  $x_3 = 1$  ověříme, že vektory  $(1, 3, 0)$  a  $(2, 1, 1)$  vyhovují soustavě, a tím pádem jí vyhovují všechny na přímce (opět tím ale neověříme, zda neexistuje nějaké ještě jiné řešení).

**Cv. 2.3** Kolik existuje různých odstupňovaných tvarů pro matice  $3 \times 4$  (bez ohledu na konkrétní hodnoty prvků)? A kolik pro matice  $n \times n$ ?

### Řešení:

Různé odstupňované tvary se odlišují počtem a pozicí pivotů. Matice  $3 \times 4$  v odstupňovaném tvaru může mít 0 až 3 pivety (v každém řádku a sloupci nanejvýš 1). Pro matici hodnosti  $r$  se pivety vždy nachází postupně v prvních  $r$  řádcích odstupňovaného tvaru, stačí proto uvažovat umístění pivotů do různých sloupců. Pro matici  $3 \times 4$  můžeme najít následujících 15 různých odstupňovaných tvarů:

- jeden odstupňovaný tvar s 0 pivoty (nulová matice):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

- 4 odstupňované tvary s 1 pivotem:

$$\begin{pmatrix} \bullet & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \bullet & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{0} & \bar{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \bullet & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

- 6 odstupňovaných tvarů se 2 pivoty:

$$\begin{pmatrix} \bullet & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bullet & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bullet & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{0} & \bullet & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bullet & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{0} & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \bullet & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bullet & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \bullet & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{0} & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \bullet & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

- 4 odstupňované tvary se 3 pivoty:

$$\begin{pmatrix} \bullet & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bullet & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bullet & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bullet & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bullet & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{0} & \bullet \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bullet & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{0} & \bullet & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bullet \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \bullet & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bullet & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bullet \end{pmatrix}.$$

Obecně, matice  $n \times n$  může mít 0 až  $n$  pivotů, v každém z  $n$  sloupců se pivot buď nachází (v prvním řádku, který je dosud bez pivota), nebo nenachází, dostaneme tedy  $2^n$  možných různých odstupňovaných tvarů. Alternativně, pro  $k \in \{0, \dots, n\}$  pivotů máme  $\binom{n}{k}$  možných rozmístění do  $n$  sloupců, tj. celkem  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$  odstupňovaných tvarů.

**Cv. 2.4** Nechť matice  $A$  je v odstupňovaném (tj. REF) tvaru. Diskutujte, které podmatice  $A$  jsou také v REF a které už být nemusí.

### Řešení:

Z matice  $A$  můžeme odstranit libovolný řádek nebo více řádků a podmínky na REF tvar zůstanou zachovány, čili tato operace zachovává vlastnost být v odstupňovaném tvaru.

Libovolný sloupec vynechat nemůžeme, například odstraněním prvního sloupce z matice  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  dostaneme matici, která v REF tvaru není. Můžeme ale odstranit jakékoli nebázické sloupce (tj. ty bez pivota) a také libovolné sloupce zprava.

**Cv. 2.5** Známe elementární řádkové úpravy. Které řádkové úpravy ale jsou „nesprávné“?

**Řešení:**

Například vynásobení řádku nulou. Nebo odečtení řádku od sebe sama. Nebo odečtení naráz dvou řádků navzájem od sebe (čili děláme najednou dvě úpravy; každá z nich je v pořádku, ale musíme je vykonat postupně).

**Cv. 2.6** Najděte soustavu 3 lineárních rovnic o 4 proměnných s řešením

- $(x_1, x_2, x_3, x_4) = t \cdot (-2, 1, 0, 0), \quad t \in \mathbb{R}.$
- $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 2, 3, 4) + t \cdot (-2, 1, 0, 0) + s \cdot (0, 0, 1, 1), \quad t, s \in \mathbb{R}.$

**Řešení:**

Toto je kreativní příklad, možných soustav  $(A | b)$  je bezpočet a lze k nim dospět různými úvahami.

- Protože je množinou řešení přímka, musíme sestavit alespoň 3 rovnice. Dále si uvědomíme, že mezi řešeními je nulový vektor (volbou  $t := 0$ ), tudíž musí být pravá strana nulová, čili  $(b_1, b_2, b_3) = (0, 0, 0)$ . Protože řešení splňuje  $x_3 = x_4 = 0$ , třetí a čtvrtý sloupec matice  $A$  mohou obsahovat libovolné hodnoty. A konečně, protože  $x_1 = -2x_2$ , musí být první sloupec matice  $A$  polovinou druhého sloupce.

Hledanou soustavou tak může být například

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Analogicky jako v předchozím případě sestavíme matici  $A$ . Vektor  $b$  dopočítáme tak, aby  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 2, 3, 4)$  bylo řešením rovnic. Můžeme vzít například

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

**Cv. 2.7** Najděte konkrétní matici  $A$  takovou, aby počet řešení soustavy  $(A | b)$  byl:

- $\infty$  pro každé  $b$ ,

**Řešení:**

Například  $A = (1 1)$ . Dané podmínce vyhovují právě matice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , splňující vztah  $\text{rank}(A) = m < n$ .

- 1 pro každé  $b$ ,

**Řešení:**

Například  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Dané podmínce vyhovují právě matice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , splňující vztah  $\text{rank}(A) = m = n$ .

- 0 nebo 1, v závislosti na  $b$ ,

**Řešení:**

Například  $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Dané podmínce vyhovují právě matice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , splňující vztah  $\text{rank}(A) = n \leq m$ .

(d) 0 nebo  $\infty$ , v závislosti na  $b$ .

**Řešení:**

Například  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Dané podmínce vyhovují právě matice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , splňující vztah  $\text{rank}(A) < \min\{m, n\}$ .

**Cv. 2.8** Vyřešte soustavu lineárních rovnic  $n \times n$ :

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -1 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ -1 & \dots & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

**Řešení:**

V zásadě aplikujeme standardní postup Gaussovy eliminace, i když u těchto typů příkladů je občas výhodnější k odstupňovanému tvaru matice dospět jinou sérií elementárních úprav.

Nejprve přičteme první řádek ke všem ostatním:

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ -1 & 1 & \ddots & & \vdots & 1 \\ -1 & -1 & \ddots & \ddots & \vdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ -1 & -1 & \dots & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots & 2 \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & \vdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & -1 & \dots & -1 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

Nyní druhý řádek přičteme ke všem, co se nachází pod ním:

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots & 2 \\ 0 & -1 & 1 & \ddots & \vdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & -1 & \dots & -1 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 1 & 4 \end{array} \right).$$

Tento postup opakujeme, dokud nedospějeme k matici v odstupňovaném tvaru:

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & 2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2^{n-1} \end{array} \right).$$

Z pravé strany matice vyčteme řešení  $x = (x_1, \dots, x_n) = (1, 2, 4, \dots, 2^{n-1})$ .

Tento příklad ilustruje ještě jednu vlastnost Gaussovy eliminace a obecně řešení soustav rovnic. Vstupní hodnoty jsou malá celá čísla, pouze 0, 1 a  $-1$ . Nicméně během úprav matice, stejně jako na výstupu jako řešení, jsme dostali některá čísla exponenciálně velká (konkrétně  $2^{n-1}$ ). S touto vlastností musíme počítat mj. při návrhu a implementaci numerických metod na řešení (potenciálně hodně velkých) soustav rovnic. Velká čísla nebo čísla velmi blízko nuly totiž zhoršují numerické vlastnosti řešení (zaokrouhlovací chyby během výpočtu mohou narůstat).

**Cv. 2.9** Vyřešte soustavu lineárních rovnic s parametrem  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array} \right).$$

**Řešení:**

Pomocí Gaussovy eliminace převedeme matici na odstupňovaný tvar:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & 1-a \end{array} \right)$$

Hodnota v matici na pozici  $(3, 3)$  je  $2 - a - a^2 = (1 - a)(a + 2)$  a v závislosti na hodnotě parametru  $a$  může být někdy nulová. Proto musíme provést následující rozbor případů:

- „Případ  $a = -2$ .“ Poslední řádek odpovídá rovnici  $(1 - a)(a + 2)x_3 = 1 - a$ , neboli  $0 \cdot x_3 = 3$ . V tomto případě řešení neexistuje.
- „Případ  $a = 1$ .“ Poslední řádek odpovídá rovnici  $(1 - a)(a + 2)x_3 = 1 - a$ , neboli  $0 \cdot x_3 = 0$ . Předchozí řádek je také nulový. Tudíž zbývá jediná rovnice, a to první, která má tvar  $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ . V tomto případě je množina řešení nekonečná a je tvaru

$$(1 - x_2 - x_3, x_2, x_3), \quad \text{kde } x_2, x_3 \in \mathbb{R}.$$

- „Případ  $a \notin \{-3, 1\}$ .“ Nyní je hodnota v matici na pozici  $(3, 3)$  nenulová a jedná se o pivota. Zpětnou substitucí tedy dopočítáme jednoznačné řešení

$$(x_1, x_2, x_3) = \left( \frac{1}{a+2}, \frac{1}{a+2}, \frac{1}{a+2} \right).$$

**Cv. 2.10** Vyřešte soustavu lineárních rovnic s různými pravými stranami:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 1 & -5 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} -9 \\ 13 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -15 \end{pmatrix}.$$

To jest, vyřešte tři soustavy  $(A | b_i)$  pro  $i = 1, 2, 3$ . Navrhněte co nejefektivnější způsob!

**Řešení:**

Jelikož lze pro všechny tři soustavy použít Gaussovou eliminaci se stejnou sérií elementárních řádkových úprav, můžeme uvažovat všechny tři pravé strany najednou a aplikovat eliminaci na matici

$$\begin{aligned} \left( \begin{array}{ccc|ccccc} 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ -3 & 1 & 2 & -3 & 3 & -15 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{ccc|ccccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ -3 & 1 & 2 & -3 & 3 & -15 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left( \begin{array}{ccc|ccccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 0 & -14 & 14 & 0 & 42 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & -7 & -7 & -21 & 7 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left( \begin{array}{ccc|ccccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Řešením soustavy je tedy vektor  $x = (2, 1, 1)$  pro pravou stranu  $b_1$ , vektor  $x = (1, 0, 3)$  pro  $b_2$  a vektor  $x = (4, -1, -1)$  pro  $b_3$ .