

VYTVORUJÍCÍ FUNKCE A JEJICH APLIKACE:

TRIPOMENUTÍ Ž PAMUĽA:

- CHĚME URČIT POČTY $\binom{n}{m}$ NEJAKÉHO KOMBINATORICKÉHO OBJEKTU
- PŘEĚADÍME DANÉMU OBJEKTU **VYTVORUJÍCÍ FUNKCI** $a(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m$
- KOFICIENTY a_m LZE NĚKDY URČIT APLIKOVÁNÍM ZÁKLADNÍCH OPERACÍ (SOUČET, NÁSOBEK, MĚNOVÁNÍ, ...) NA ZÁKLADNÍ VYTVORUJÍCÍ FUNKCE

$\left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x} \text{ PRO } \underbrace{(1, \dots, 1, 0, 0, \dots)}_{m+1}, \frac{1}{1-x} \text{ PRO } (1, 1, \dots) \text{ A } (1+x)^n \text{ PRO } \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots \right)$

- VYTVORUJÍCÍ FUNKCE LZE POUŽÍT K **ŘEŠENÍ REKURENCÍ** TYPU $a_{n+k} = \alpha_{k-1} a_{n+k-1} + \dots + \alpha_0 a_n$ PRO $\alpha_0, \dots, \alpha_{k-1} \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$

- ROZŠÍŘÍME SI RÉPERTOÁR ZÁKLADNÍCH VYTVORUJÍCÍCH FUNKCÍ

- PRO $n \in \mathbb{R}$ A $k \in \mathbb{Z}_0^+$ DEFINUJME (ZOBECNĚNÝ) BINOMICKÝ KOFICIENT TAKO

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \quad (\text{SPECIÁLNĚ } \binom{n}{0} = 1)$$

- OBJEVNĚNÍ METODY, KTERÁ UVEDL Z CANNONOVĚ NA ROVINĚ POKRSLI KVALIFI MORU

VĚTA 3.7 (ZOBECNĚNÁ BINOMICKÁ VĚTA):

$\forall n \in \mathbb{R}$ ŽE $(1+x)^n$ VYTVORUJÍCÍ FUNKCÍ POSLOUPNOSTI $\left(\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots \right)$ A ŘADA $\sum_{i=0}^{\infty} \binom{n}{i} x^i$ KONVERGUJE PRO $\forall x \in (-1, 1)$.

DK (NÁČRT):

- MATEMATICKÁ ANALÝZA: FUNKCE f ŽE ROVNA SVĚMŮ TAYLOROVĚ ROZVOJI NA OKOLÍ BODU a , NEBO

PRO x MA OKOLÍ a

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i$$
, POKUD \exists VŠECHNY DERIVACE, SOUČET ŘADY KONVERGUJE A ŽBŽTKY ŽOUB K NULE

- APLIKUJME NA $f(x) = (1+x)^n$ A $a=0$ (DERIVACE EXISTUJÍ)

$f(x) = (1+x)^n$
 $f'(x) = n(1+x)^{n-1}$
 $f''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$
 \vdots
 $f^{(i)}(x) = n(n-1)\dots(n-i+1)(1+x)^{n-i}$

$f(0) = (1+0)^n = 1$
 $f'(0) = n(1+0)^{n-1} = n$
 $f''(0) = n(n-1)(1+0)^{n-2} = n(n-1)$
 \vdots
 $f^{(i)}(0) = n(n-1)\dots(n-i+1)$

$\frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} (x-a)^{m+1}$
 PRO $\xi \in (a, x)$

$(1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!} (x-0) + \frac{n(n-1)}{2!} (x-0)^2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{n}{i} x^i$ PRO $x \in (-1, 1)$

- KONVERGENCI LZE OVRĚDIT **PODÍLOVÝM KRITÉRIEM:**

ŽBŽTKY: $\left| \binom{n}{i} x^i \right| \cdot (1+\xi)^n \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$ PRO $\xi \in (0, x), x < 1$



DŮSLEDEK 3.2:

$\forall m \in \mathbb{N} \forall x \in (-1, 1)$ platí $\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{m+i-1}{m-1} x^i$ (2)

DŮK: VĚTA 3.1

$(1-x)^{-m} = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{-m}{i} (-x)^i = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-m)(-m-1)\dots(-m-i+1)}{i!} \cdot (-x)^i =$

vytknutí minus znamének

$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{m(m+1)\dots(m+i-1)}{i!} x^i = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{m+i-1}{i} x^i =$

$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{m+i-1}{m-1} x^i$ $\binom{m+i-1}{i} = \binom{m+i-1}{m-1}$ ☒

DŮK 2 (KOMBINATORICKĚ):

$\frac{1}{(1-x)^m} = \underbrace{(1+x+x^2+\dots)(1+x+x^2+\dots)\dots(1+x+x^2+\dots)}_m = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$
 pro $x \in (-1, 1)$

$a_i =$ počet rozkladů čísla i na m nezáporných sčítanců
 ↳ z k -tých závorek vybereme člen s exponentem odpovídajícím k -tému sčítanci v rozkladu i

$\Rightarrow a_i = \binom{m+i-1}{m-1}$



náme $m+i-1$ objektů, $m-1$ z nich vybereme a prohlásíme za hrabla |, zbylých i objektů tvoří kuličky \circ . A počet kulíček nebo hrabův určuje velikost příslušného sčítance v rozkladu ☒

PŘÍKLAD:

- pro $m=3$:

$\frac{1}{(1-x)^3} = \binom{2}{2} + \binom{3}{2}x + \binom{4}{2}x^2 + \dots + \binom{i+2}{2}x^i + \dots$

APLIKACE - POČÍTÁNÍ BINÁRNÍCH ZAKRĚNĚNÝCH STROMŮ:

- **ZAKRĚNĚNÝ BINÁRNÍ STROM** - BUĎ JE PRŮZONÝ, NEBO DĚSNAVŮZE SPECIÁLNÍ VŘECHOZ ZVLÁŠŤ **KUŘEN** A PÁR ZAKRĚNĚNÝCH BINÁRNÍCH STROMŮ, KTERÉ TVOŘÍ **LĚVÝ** A **PRAVÝ** **PODSTROM**



- PRÍKLADY:



- b_m = POČET BINÁRNÍCH ZAKRĚNĚNÝCH STROMŮ NA $m \in \mathbb{N}_0$ VRCHOLECH

$\Rightarrow b_0 = 1, b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 5, b_4 = 14, \dots$

- NECHŤ $b(x) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m x^m$ JE PŘÍSLUŠNÁ VYTVOŘUJÍCÍ FUNKCE


VĚTA 3.3:

PRO KAŽDÉ $m \in \mathbb{N}_0$ PLATÍ $b_m = \frac{1}{m+1} \binom{2m}{m}$.

C_m = m-TÉ CATALANOVÉ ČÍSLO


- CATALANOVÁ ČÍSLA MÁJÍ MNOHO INTERPRETACÍ, NAPŘÍKLAD:

C_m = POČET TRIANSULACÍ (m+2)-SONN



OK VĚTY 3.3:

- PRO $\forall m \geq 1$ PLATÍ $b_m = b_0 b_{m-1} + b_1 b_{m-2} + \dots + b_{m-1} b_0$ (*)



- POČET OPERACE NÁSOBENÍ VYTVOŘUJÍCÍCH FUNKCÍ JE PRAVÁ STRONA (*) ROVNA KOEFICIENTŮ x^{m-1} V $b(x) \cdot b(x)$

- PŘÍKLAD TABULKOH:

KOEFICIENT x^m V $b(x)$ JE $\sum_{i=0}^m b_i b_{m-i}$ POČET OPERACE NÁSOBENÍ

POSUN DOPRAVA $\leftarrow x \cdot b(x) \cdot b(x)$

PŘÍČTEMÍ $b_0 = 1 \leftarrow 1 + x \cdot b(x) \cdot b(x)$

$b_0 = 1$	$b_1 = 1$	$b_2 = 2$...
b_0^2	$b_0 b_1 + b_1 b_0$	$b_0 b_2 + b_1^2 + b_2 b_0$...
$= b_1$	$= b_2$	$= b_3$	POČET (*)
0	b_1	b_2	...
$1 = b_0$	b_1	b_2	...

$\Rightarrow b(x) = 1 + x \cdot b(x) \cdot b(x)$

- ŘEŠÍME JAKO KVADRATICKOU ROVNICI S PROMĚNNOU $b(x)$ (A PARAMETREM x)

$\Rightarrow b(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$

- SPRÁVNÁ VOLBA JE $b(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$, PROTOŽE $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x} = \infty$

ALE $\lim_{x \rightarrow 0^+} b(x) = b_0 = 1 \neq \infty$

\Rightarrow ZNÁME VYTVOŘENÍ FUNKCI $b(x)$ A ZBÝVÁ URČIT KŮEFICIENTY b_m

- POUŽE ZOBECNĚNÉ BINOMICKÉ VĚTY (VĚTA 3.1) PLATÍ

$\sqrt{1-4x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-4)^k \binom{1/2}{k} \cdot x^k$ $= b_{k-1}$

- Tedy $b(x) = \frac{1 - \sum_{k=0}^{\infty} (-4)^k \binom{1/2}{k} \cdot x^k}{2x} = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{1}{2} \cdot (-4)^k \binom{1/2}{k} x^{k-1}$
ČLEN $k=0$ SE VYRUKŠÍ S 1, VYDĚLÍME x

$\Rightarrow b_m = -\frac{1}{2} (-4)^{m+1} \binom{1/2}{m+1} = \underbrace{-\frac{1}{2} (-4)^{m+1}}_{(m+1)\text{-KRÁT MINUS}} \cdot \underbrace{\frac{\frac{1}{2} (\frac{1}{2}-1) \dots (\frac{1}{2}-m)}{(m+1)!}}_{m\text{-KRÁT MINUS}} =$

$= (-1)^{m+2} \cdot 2^{m+1} \cdot \frac{(-1) \frac{1}{2} (\frac{1}{2}) (\frac{3}{2}) \dots (\frac{2m-1}{2})}{(m+1)!} =$
V ČÍSLITELU ODELIŇME ČÍSLA 2^{m+1} MINUSY \Rightarrow NIČÍ, PROTOŽE $(-1)^{2m+2} = 1$

$= 2^m \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2m-1)}{(m+1)!} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2m)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2m)} = 2^m \cdot \frac{1}{2^m} \cdot \frac{(2m)!}{(m+1)! \cdot m!} =$

$= \frac{1}{m+1} \cdot \binom{2m}{m} = \underline{\underline{C_m}}$

$(m+1)! = (m+1) \cdot m!$



ROZKLADY ČÍSEL NA SČÍTANČE:

- VÍNE:

$\forall m \in \mathbb{N}$ lze rozložit na $k \in \mathbb{N}$ kladných uspořádaných sčítanců
($\binom{m-1}{k-1}$ způsobů (upřesnění k-1 hranec na m-1 pozic))

- například pro $m=4$ a $k=2$ máme $= 3+1 = 2+2 = 1+3$
.....

\Rightarrow počet c_m uspořádaných rozkladů na m kladné sčítance je
rověn $c_m = \sum_{k=1}^m \binom{m-1}{k-1} = 2^{m-1}$

binomická věta

základní operace

operace do sčítání
zx do $\frac{1}{1-x}$,
posun vpravo a
přičtení $c_0=1$

- jak je to s neuspořádanými rozklady?

- p_m = počet neuspořádaných rozkladů m na kladné sčítance
- příklady:

$p_0 = 1$

$p_1 = 1$

$p_2 = 2 \quad 2 = 1+1$

$p_3 = 3 \quad 3 = 2+1 = 1+1+1$

$p_4 = 5 \quad 4 = 3+1 = 2+2 = 2+1+1 = 1+1+1+1$

$p_5 = 7 \quad 5 = 4+1 = 3+2 = 3+1+1 = 2+2+1 = 2+1+1+1 = 1+1+1+1+1$

je znám přesný a velmi komplikovaný vzorec (Hardy-Ramanujan-Rademacher)

- určení p_m je mnohem těžší problém než určení c_m

- obecně - nemá žádný "snadný" vzorec pro p_m

- přesto známe vytvořující funkci $p(x) = \sum_{m=0}^{\infty} p_m x^m$

$p(x) = (1+x+x^2+x^3+\dots)(1+x^2+x^4+x^6+\dots)(1+x^3+x^6+x^9+\dots)\dots$
zaps $m = p_1 \cdot 1 + p_2 \cdot 2 + \dots$ zachycuje člen $x^{k_i \cdot i}$ vybrany z i-té závorky

$= \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^k}$

$k_i \in \{0,1,2,\dots\}$ je počet výskytů čísla i v rozkladu čísla m

- analytickými metodami pak lze zjistit asympt. odhad

$p(m) \sim \frac{1}{4m\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{\frac{2m}{3}}}$