

# Kombinatorika a grafy 1

Martin Balko

## 5. přednáška

2. listopadu 2022



# Konečné projektivní roviny

## Připomenutí z minula I

## Připomenutí z minula I

- Množinový systém  $(X, \mathcal{P})$  je **konečná projektivní rovina**, pokud platí:

$$(A1) \quad \forall x, y \in X, x \neq y \exists! P \in \mathcal{P} : \{x, y\} \subseteq P,$$

$$(A2) \quad \forall P, Q \in \mathcal{P}, P \neq Q : |P \cap Q| = 1,$$

$$(A3) \quad \exists C \subseteq X, |C| = 4 \forall P \in \mathcal{P} : |C \cap P| \leq 2.$$

Prvky z  $X$  nazýváme **body** a množiny z  $\mathcal{P}$  jsou **přímky**.



## Připomenutí z minula I


- Množinový systém  $(X, \mathcal{P})$  je **konečná projektivní rovina**, pokud platí:

$$(A1) \quad \forall x, y \in X, x \neq y \exists! P \in \mathcal{P} : \{x, y\} \subseteq P,$$

$$(A2) \quad \forall P, Q \in \mathcal{P}, P \neq Q : |P \cap Q| = 1,$$

$$(A3) \quad \exists C \subseteq X, |C| = 4 \quad \forall P \in \mathcal{P} : |C \cap P| \leq 2.$$

Prvky z  $X$  nazýváme **body** a množiny z  $\mathcal{P}$  jsou **přímky**.



Obrázek: Fanova rovina.

## Připomenutí z minula II

## Připomenutí z minula II

### Tvrzení 4.1

V konečné projektivní rovině mají všechny přímky stejný počet bodů.

## Připomenutí z minula II

### Tvrzení 4.1

V konečné projektivní rovině mají všechny přímky stejný počet bodů.

- **Řád** konečné projektivní roviny = počet bodů na přímce  $- 1$ .

## Připomenutí z minula II

### Tvrzení 4.1

V konečné projektivní rovině mají všechny přímky stejný počet bodů.

- **Řád** konečné projektivní roviny = počet bodů na přímce  $- 1$ .

### Tvrzení 4.2

V konečné projektivní rovině řádu  $n$  platí:

- každým bodem prochází právě  $n + 1$  přímkou,
- $|X| = n^2 + n + 1$ ,
- $|\mathcal{P}| = n^2 + n + 1$ .

## Připomenutí z minula II

### Tvrzení 4.1

V konečné projektivní rovině mají všechny přímky stejný počet bodů.

- **Řád** konečné projektivní roviny = počet bodů na přímce  $- 1$ .

### Tvrzení 4.2

V konečné projektivní rovině řádu  $n$  platí:

- každým bodem prochází právě  $n + 1$  přímkou,
- $|X| = n^2 + n + 1$ ,
- $|\mathcal{P}| = n^2 + n + 1$ .

- **Duál** množinového systému  $(X, \mathcal{P})$  je  $(\mathcal{P}, \{\{S \in \mathcal{P} : x \in S\} : x \in X\})$ .

## Připomenutí z minula II

### Tvrzení 4.1

V konečné projektivní rovině mají všechny přímky stejný počet bodů.

- **Řád** konečné projektivní roviny = počet bodů na přímce  $- 1$ .

### Tvrzení 4.2

V konečné projektivní rovině řádu  $n$  platí:

- každým bodem prochází právě  $n + 1$  přímek,
- $|X| = n^2 + n + 1$ ,
- $|\mathcal{P}| = n^2 + n + 1$ .

- **Duál** množinového systému  $(X, \mathcal{P})$  je  $(\mathcal{P}, \{\{S \in \mathcal{P} : x \in S\} : x \in X\})$ .

### Tvrzení 4.3

Duálem konečné projektivní roviny řádu  $n$  je konečná projektivní rovina řádu  $n$ .

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1


Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .



# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .




Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .




Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .




Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .




Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .




Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .




Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .




Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.

# Konstrukce konečných projektivních rovin z těles

## Věta 5.1

Existuje-li algebraické těleso s  $n$  prvky, pak existuje konečná projektivní rovina řádu  $n$ .



Obrázek: Příklad konstrukce: Fanova rovina.



# Latinské čtverce

# Navzájem ortogonální latinské čtverce

# Navzájem ortogonální latinské čtverce

- Tři navzájem ortogonální latinské čtverce řádu 4:

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

1	2	3	4
3	4	1	2
4	3	2	1
2	1	4	3

1	2	3	4
4	3	2	1
2	1	4	3
3	4	1	2

# Navzájem ortogonální latinské čtverce

- Tři navzájem ortogonální latinské čtverce řádu 4:

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

1	2	3	4
3	4	1	2
4	3	2	1
2	1	4	3

1	2	3	4
4	3	2	1
2	1	4	3
3	4	1	2



# Navzájem ortogonální latinské čtverce

- Tři navzájem ortogonální latinské čtverce řádu 4:

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

1	2	3	4
3	4	1	2
4	3	2	1
2	1	4	3

1	2	3	4
4	3	2	1
2	1	4	3
3	4	1	2




# Navzájem ortogonální latinské čtverce

- Tři navzájem ortogonální latinské čtverce řádu 4:

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

1	2	3	4
3	4	1	2
4	3	2	1
2	1	4	3

1	2	3	4
4	3	2	1
2	1	4	3
3	4	1	2



# Navzájem ortogonální latinské čtverce

- Tři navzájem ortogonální latinské čtverce řádu 4:

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

1	2	3	4
3	4	1	2
4	3	2	1
2	1	4	3

1	2	3	4
4	3	2	1
2	1	4	3
3	4	1	2




**SCIENTIFIC  
AMERICAN**



"GRABCO-LATIN" SQUARE

FIFTY CENTS


November 1959




## Příklad konstrukce NOLČ z KPR




# Příklad konstrukce NOLČ z KPR





# Příklad konstrukce NOLČ z KPR




# Příklad konstrukce NOLČ z KPR



# Příklad konstrukce NOLČ z KPR




# Příklad konstrukce NOLČ z KPR



$L_1$

1			
	1		
		1	
			1

# Příklad konstrukce NOLČ z KPR




$L_1$

1	2		
2	1		
		1	2
		2	1



# Příklad konstrukce NOLČ z KPR




$L_1$

1	2	3	
2	1		3
3		1	2
	3	2	1



# Příklad konstrukce NOLČ z KPR





$L_1$

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1






# Příklad konstrukce NOLČ z KPR



# Příklad konstrukce NOLČ z KPR




$L_1$

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

$L_2$


# Příklad konstrukce NOLČ z KPR





$L_1$

1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1



$L_2$

1	2	3	4
3	4	1	2
4	3	2	1
2	1	4	3


# Příklad konstrukce NOLČ z KPR



# Příklad konstrukce NOLČ z KPR



# Příklad konstrukce NOLČ z KPR



$L_1$


1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

$L_2$

1	2	3	4
3	4	1	2
4	3	2	1
2	1	4	3


$L_3$

1	2	3	4
4	3	2	1
2	1	4	3
3	4	1	2



Zdroj: „Chapter on The history of latin squares“, Andersen, Lars Døvling

Obrázek: Foto z článku „**Major Mathematical Conjecture Propounded 177 Years Ago Is Disproved**“ z *New York Times* (1959) o vyvrácení Eulerovy domněnky o latinských čtvercích („Pro žádné  $n \equiv 2 \pmod{4}$  neexistují dva NOLČ řádu  $n$ .“).



Zdroj: „Chapter on The history of latin squares“, Andersen, Lars Døvling

Obrázek: Foto z článku „**Major Mathematical Conjecture Propounded 177 Years Ago Is Disproved**“ z *New York Times* (1959) o vyvrácení Eulerovy domněnky o latinských čtvercích („Pro žádné  $n \equiv 2 \pmod{4}$  neexistují dva NOLČ řádu  $n$ .“).

Děkuji za pozornost.