

Kombinatorika a grafy 1 — 1. cvičení*

4. října 2024

1 Odhad

Mějme nezáporné funkce $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$. Potom značení $f(n) = O(g(n))$ znamená, že existují konstanty C a n_0 takové, že pro každé $n \geq n_0$ platí $f(n) \leq C \cdot g(n)$. Neboli funkce f roste asymptoticky nanejvýš tak rychle jako g . Podobně využíváme i následující značení:

Značení	Definice	Význam
$f(n) = \Omega(g(n))$	$\exists C > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0: f(n) \geq C \cdot g(n)$	f roste aspoň tak rychle jako g
$f(n) = \Theta(g(n))$	$\exists C_1 > 0 \exists C_2 > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0: C_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq C_2 \cdot g(n)$	f a g mají stejnou asymptotiku
$f(n) = o(g(n))$	$\forall C > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0: f(n) \leq C \cdot g(n)$	f roste mnohem pomaleji než g
$f(n) \sim g(n)$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$	$f(n)$ a $g(n)$ jsou téměř shodné

Známe už i odhad $\frac{2^{2n}}{2\sqrt{n}} \leq \binom{2n}{n} \leq \frac{2^{2n}}{\sqrt{2n}}$ a Stirlingův vzorec $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Příklad 1. Seřaďte následující výrazy podle velikosti pro velké n (tedy například pro $n > 10^{10^{10}}$):

$$2^{2n}, e^{\ln^3 n}, \binom{2n}{n}, n^{\ln n}, (\sqrt{n})^n.$$

Příklad 2. Rozhodněte, zda jsou následující výrazy pravdivé.

- (a) $n! = 2^{O(n)}$,
- (b) $n^2 + 5n \ln n = n^2(1 + o(1)) \sim n^2$,
- (c) $n^{\ln n} = 2^{\Omega(n)}$,
- (d) $\sum_{i=1}^n i^8 = \Theta(n^9)$.

Příklad 3. Nalezněte kladné a neklesající funkce $f(n)$ a $g(n)$ definované pro všechna přirozená čísla tak, aby neplatilo $f(n) = O(g(n))$ a ani $g(n) = O(f(n))$.

Příklad 4. Uvažme náhodnou procházku v $\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}$ začínající v počátku, kde se v každém kroku $i = 1, 2, \dots$ rozhodneme náhodně uniformně nezávisle, v jakém směru budeme pokračovat.

- (a) Odhadněte střední hodnotu počtu návratů do počátku v \mathbb{Z} . Je tato hodnota shora omezená?
- (b) Odhadněte střední hodnotu počtu návratů do počátku v $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
- (c) (*) Odhadněte střední hodnotu počtu návratů do počátku pro náhodnou procházku v $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

*Informace o cvičení naleznete na <http://kam.mff.cuni.cz/~balko/>