

Kombinatorika a grafy I

Martin Balko

3. přednáška

5. března 2019



Vytvořující funkce a jejich aplikace

Binární zakořeněné stromy

- Příklady binárních zakořeněných stromů s ≤ 4 vrcholy:

$$b_0 = 1$$

$$b_1 = 1$$




$$b_2 = 2$$



$$b_3 = 5$$



$$b_4 = 14$$



Catalanova čísla

Catalanova čísla

- Definována jako $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ pro $n \geq 0$.

Catalanova čísla

- Definována jako $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ pro $n \geq 0$.
- Hodnoty: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, ...

Catalanova čísla

- Definována jako $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ pro $n \geq 0$.
- Hodnoty: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, ...
- Objevil je Leonhard Euler v roce 1751.



Obrázek: Leonhard Euler (1707–1783) a Eugène C. Catalan (1814–1894).

Zdroj: <http://en.wikipedia.org>

Catalanova čísla

- Definována jako $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ pro $n \geq 0$.
- Hodnoty: 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, ...
- Objevil je Leonhard Euler v roce 1751.



Obrázek: Leonhard Euler (1707–1783) a Eugène C. Catalan (1814–1894).

Zdroj: <http://en.wikipedia.org>

- Je známo přes 200 interpretací: <http://www-math.mit.edu/~rstan/ec>

Interpretace Catalanových čísel I

- Platí C_n = počet triangulací $(n + 2)$ -gonu.

$$C_1 = 1$$




$$C_2 = 2$$



$$C_3 = 5$$



$$C_4 = 14$$



Interpretace Catalanových čísel II

- Platí C_n = počet správných uzávorkování s n páry závorek.

$$C_1 = 1 \quad ()$$

$$C_2 = 2 \quad ()() \quad ((()))$$

$$C_3 = 5 \quad ()()() \quad ()((())) \quad ((())()) \quad ((())() \quad (((())))$$

$$()$$

$$()$$

$$()$$

$$()$$

$$C_4 = 14 \quad ()(((()) \quad ((())()) \quad (((())()) \quad (((())())$$

$$((())()) \quad ()((()) \quad ((())(()) \quad ((())())$$

$$((())()) \quad (((())())$$

Interpretace Catalanových čísel III

- Platí $C_n =$ počet Dyckových cest v $(n+1) \times (n+1)$ mřížce (= schodišť pod diagonálou).


$$C_1 = 1$$




$$C_2 = 2$$



$$C_3 = 5$$




$$C_4 = 14$$




Interpretace Catalanových čísel IV

- Platí C_n = počet způsobů, jak si $2n$ lidí u stolu může potřást rukama, aniž by došlo ke křížení.


$$C_1 = 1$$




$$C_2 = 2$$



$$C_3 = 5$$



$$C_4 = 14$$



Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

- Pro $n \in \mathbb{N}_0$ bud' I_n počet neuspořádaných rozkladů n na liché sčítance.

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

- Pro $n \in \mathbb{N}_0$ bud' I_n počet neuspořádaných rozkladů n na liché sčítance.

$$3 = 3 = 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_3 = 2,$$

$$4 = 3 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 3 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_5 = 3,$$

$$6 = 5 + 1 = 3 + 3 = 3 + 1 + 1 + 1 = 1 + \dots + 1 \Rightarrow I_6 = 4.$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

- Pro $n \in \mathbb{N}_0$ bud' I_n počet neuspořádaných rozkladů n na liché sčítance.

$$3 = 3 = 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_3 = 2,$$

$$4 = 3 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 3 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_5 = 3,$$

$$6 = 5 + 1 = 3 + 3 = 3 + 1 + 1 + 1 = 1 + \dots + 1 \Rightarrow I_6 = 4.$$

- Bud' r_n počet neuspořádaných rozkladů n na různé sčítance.

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

- Pro $n \in \mathbb{N}_0$ bud' I_n počet neuspořádaných rozkladů n na liché sčítance.

$$3 = 3 = 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_3 = 2,$$

$$4 = 3 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 3 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_5 = 3,$$

$$6 = 5 + 1 = 3 + 3 = 3 + 1 + 1 + 1 = 1 + \dots + 1 \Rightarrow I_6 = 4.$$

- Bud' r_n počet neuspořádaných rozkladů n na různé sčítance.

$$3 = 3 = 2 + 1 \Rightarrow r_3 = 2,$$

$$4 = 4 = 3 + 1 \Rightarrow r_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 4 + 1 = 3 + 2 \Rightarrow r_5 = 3,$$

$$6 = 6 = 5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 2 + 1 \Rightarrow r_6 = 4,$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

- Pro $n \in \mathbb{N}_0$ bud' I_n počet neuspořádaných rozkladů n na liché sčítance.

$$3 = 3 = 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_3 = 2,$$

$$4 = 3 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 3 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_5 = 3,$$

$$6 = 5 + 1 = 3 + 3 = 3 + 1 + 1 + 1 = 1 + \dots + 1 \Rightarrow I_6 = 4.$$

- Bud' r_n počet neuspořádaných rozkladů n na různé sčítance.

$$3 = 3 = 2 + 1 \Rightarrow r_3 = 2,$$

$$4 = 4 = 3 + 1 \Rightarrow r_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 4 + 1 = 3 + 2 \Rightarrow r_5 = 3,$$

$$6 = 6 = 5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 2 + 1 \Rightarrow r_6 = 4,$$

Věta

Pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí $I_n = r_n$.

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

- Pro $n \in \mathbb{N}_0$ bud' I_n počet neuspořádaných rozkladů n na liché sčítance.

$$3 = 3 = 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_3 = 2,$$

$$4 = 3 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 3 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \Rightarrow I_5 = 3,$$

$$6 = 5 + 1 = 3 + 3 = 3 + 1 + 1 + 1 = 1 + \dots + 1 \Rightarrow I_6 = 4.$$

- Bud' r_n počet neuspořádaných rozkladů n na různé sčítance.

$$3 = 3 = 2 + 1 \Rightarrow r_3 = 2,$$

$$4 = 4 = 3 + 1 \Rightarrow r_4 = 2,$$

$$5 = 5 = 4 + 1 = 3 + 2 \Rightarrow r_5 = 3,$$

$$6 = 6 = 5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 2 + 1 \Rightarrow r_6 = 4,$$

Věta

Pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí $I_n = r_n$.

- Stačí ukázat $I(x) = r(x)$, kde $I(x) = \sum_{n=0}^{\infty} I_n x^n$ a $r(x) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n x^n$.

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots) \dots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \dots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \dots$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots) \dots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \dots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \dots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots) \dots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \dots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1+x}{1} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1+x}{1} \cdot \frac{1+x^2}{1} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1+x}{1} \cdot \frac{1+x^2}{1} \cdot \frac{1+x^3}{1} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1+x}{1} \cdot \frac{1+x^2}{1} \cdot \frac{1+x^3}{1} \cdot \frac{1+x^4}{1} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \cdots$$

- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Bonusová aplikace: rozklady čísel na liché a různé části

$$\begin{aligned}I(x) &= (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots) \cdots \\&= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots\end{aligned}$$

$$r(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \cdots$$



- Dostáváme rovnost $I(x) = r(x)$, protože

$$I(x) = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots = r(x).$$

Pro zájemce

Pro zájemce


- Více se o vytvářejících funkcích lze dozvědět například
 - na přednášce **Analytická kombinatorika**,
 - z knížky *Generatingfunctionology* (H. Wilf):
<https://www.math.upenn.edu/~wilf/gfology2.pdf>,
 - z knížky *Analytic Combinatorics* (P. Flajolet, R. Sedgewick):
<http://algo.inria.fr/flajolet/Publications/book.pdf>.



**And now
for something
completely different...**



Konečné projektivní roviny



Zdroj: <http://math.stackexchange.com>

Děkuji za pozornost.