

## 5. cvičení z PSt — 20.3.2025

### Střední hodnota diskretních náhodných veličin

1. **Základní zacházení s**  $\mathbb{E} = \sum_{x \in \text{Im}(X)} x \cdot P(X = x)$ .

1. (a) Necht'  $P(X = 100) = p$ ,  $P(X = 0) = 1 - p$ . Určete  $\mathbb{E}(X)$ . (Přímo nebo pomocí některé vlastnosti střední hodnoty.)

(b) Necht'  $P(Y = 100) = p$ ,  $P(Y = 99) = 1 - p$ . Určete  $\mathbb{E}(Y)$ .

2. (a) Máme neomezený počet černých a červených ponožek. Ponožky vytahujeme poslepu, obě barvy jsou stejně pravděpodobné. Kolik ponožek vytáhneme, než budeme mít dvě stejné barvy?

(b) Řešte totéž pro tři různé barvy.

3. Nové kasino nabízí následující hru: vsadíme  $x$  korun, s pravděpodobností  $1/2$  o ně přijdeme, ale s pravděpodobností  $1/2$  vyhraje  $2x$  (navíc k našim  $x$  korunám). (a) Začínáme s  $k$  korunami. Pokud chceme maximalizovat střední hodnotu našich zisků po  $n$  kolech, jak to udělat (a kolik ta střední hodnota je)?

(b) Jaká je pravděpodobnost, že s takovou strategií přijdeme o všechny peníze?

(c) Jakou strategii byste zvolili?

2. **Linearita  $\mathbb{E}$ , tedy**  $\mathbb{E}(a_1X_1 + \dots + a_nX_n) = a_1\mathbb{E}(X_1) + \dots + a_n\mathbb{E}(X_n)$

4. Hodíme  $n$ -krát korunou, která má pravděpodobnost, že padne Panna, rovnou  $p$ .

(a) Označme  $X$  počet po sobě jdoucích hodů PO. (Např. pokud  $n = 6$  a padlo postupně POOPOO, tak  $X = 2$ .) Určete  $\mathbb{E}(X)$ .

(b) Rozmyslete si, proč se nejedná o binomické rozdělení.

(c) Označme teď  $Y$  počet opakování hodů POP, jaká je  $\mathbb{E}(Y)$ ?

[**Nápověda:** použijte linearitu. Označme  $A_i$  jev, že  $i$ -tý hod byl P a  $(i + 1)$ -ní hod O, dále buď  $X_i = I_{A_i}$  příslušná indikátorová veličina.]

### 3. Podmíněná střední hodnota

$$\mathbb{E}(X | B) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} x \cdot P(X = x | B)$$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i P(B_i) \cdot \mathbb{E}(X | B_i) \quad B_1, B_2, \dots \text{ je rozklad } \Omega$$

5. V kvízu je 20 otázek s volbami a,b,c,d. Za správnou odpověď (vždy je jen jedna odpověď správná) je 1 bod, za špatnou  $-1/4$  bodu, za nevyplněnou otázku nula. Každá otázka je s pravděpodobností  $q$  jednou z těch, co se Kvído naučil a tedy zná správnou odpověď. Pokud správnou odpověď nezná, ví o tom, a může se rozhodnout, zda tipovat.

(a) Jaká je střední hodnota počtu bodů, které Kvído získá, pokud bude odpovídat jenom otázky, u kterých zná odpověď?

(b) A co když bude tipovat, když nezná správnou odpověď?

(c) Jak by se musela změnit penalizace za chybnou odpověď, aby byly odpovědi v částech a, b stejné?

6. Můj počítač občas zlobí: každý den s pravděpodobností  $p$  zamrzne. Když se to stane dva dny po sobě, začnu to řešit. Jaký je střední počet dnů, než se to stane?

7. V televizní soutěži si účastník může vybrat dvě otázky. U otázky A odhaduje, že správně odpoví s pravděpodobností 0.8 (a dostane za to 1 000 Kč). U otázky B je jeho pravděpodobnost úspěchu jen 0.5, zato za správnou odpověď dostane 2 000 Kč. Po špatné odpovědi hra končí, po správné může zkusit druhou otázku (a odměna za už správně zodpovězenou otázku mu při špatné odpovědi další nepropadne).

(a) Jaká je střední hodnota výhry, pokud začne otázkou A?

(b) Co když začne otázkou B?

(c) Bonus: pokud jsou pravděpodobnosti úspěchu  $p_A$ ,  $p_B$  a odměny  $m_A$ ,  $m_B$ , jak se má soutěžící rozhodnout? \* A co když těch otázek bude víc než dvě?

## K procvičení

8. Předpokládejme, že vyřešení jednoho příkladu trvá  $X$  minut, kde  $X = 1, 2, \dots$ , nebo 5. Doba trvání je náhodná (závislá třeba na počasí) a pravděpodobnostní funkce je  $p_X(1) = p_X(2) = 0.1$ ,  $p_X(3) = p_X(4) = 0.2$ ,  $p_X(5) = 0.4$ . Spočtete  $\mathbb{E}(X)$ .

9. Král Ludvík chce mít mužského potomka, aby ho mohl opět pojmenovat Ludvík. V každém roce mu jeho manželka porodí právě jedno dítě, které je stejně pravděpodobně chlapec i děvče, nezávisle na předchozích pokusech. Všechny narozené děti přežijí. Pokud se narodí chlapec, tak další potomky už Ludvík mít nebude. Označme  $S$  počet narozených synů a  $D$  počet narozených dcer. Určete  $\mathbb{E}(S)$  a  $\mathbb{E}(D)$ .

10. Hodíme  $\binom{n}{2}$ -krát korunou z minulého příkladu. Přitom tvoříme graf s vrcholy  $V = \{1, 2, \dots, n\}$ . Postupně pro všechny dvojice  $\{i, j\} \in \binom{V}{2}$  určíme, jestli jsou spojené hranou – to bude tehdy, když příslušným hodem padla Panna. Vzniklému grafu se říká náhodný graf  $G(n, p)$ .

(a) Jaká je střední hodnota počtu hran v grafu?

(b) Jaká je střední hodnota počtu trojúhelníků v grafu?

## Bonus

11. Ke každému nákupu dostaneme jako dárek autíčko – náhodně vybrané z  $n$  typů. Kolik průměrně musíme udělat nákupů, než dostaneme všechny typy autíček?

12. \* Označme  $M$  počet emailů, které dostaneme za den,  $S$  počet spamů mezi nimi,  $H$  počet „hamů“ – těch, co nejsou spamy. Předpokládejme, že  $M \sim Pois(\lambda)$  a že každý email má nezávisle na ostatních pravděpodobnost  $p$ , že je to spam.

(a) Vyjádřete  $P(S = k)$  (jako nekonečnou sumu) pomocí sdruženého rozdělení  $M$  a  $S$ .

(b) Odvoďte, že  $S \sim Pois(p\lambda)$ .

(c) Odvoďte, že  $H \sim Pois((1 - p)\lambda)$  a také, že  $H$ ,  $S$  jsou nezávislé n.v.