

# Přednáška 1, 5. října 2015

## Kapitola 1. Metrické prostory.

**Definice metrického prostoru, izometrie.** *Metrický prostor* je struktura formalizující jev vzdálenosti. Je to dvojice  $(M, d)$  množiny  $M$  a zobrazení se dvěma proměnnými

$$d : M \times M \rightarrow \mathbb{R} ,$$

zvaného *metrika* (nebo *vzdálenost*), která splňuje tyto tři axiomy (pro každé tři prvky  $x, y, z \in M$ ):

- a)  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ ,
- b)  $d(x, y) = d(y, x)$  (symetrie) a
- c)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  (trojúhelníková nerovnost).

Z axiomů snadno plyne (úloha 3), že vždy  $d(x, y) \geq 0$  — hodnoty vzdálenosti jsou nezáporná čísla.

*Izometrie* metrických prostorů  $(M, d)$  a  $(N, e)$  je bijekce  $f : M \rightarrow N$  zachovávající vzdálenosti:  $d(x, y) = e(f(x), f(y))$  pro každé  $x, y \in M$ . Existuje-li taková bijekce, jsou prostory  $(M, d)$  a  $(N, e)$  *izometrické*, což znamená prakticky nerozlišitelné.

**Příklady metrických prostorů.** V následujících příkladech se axiomy a) a b) ověří obvykle snadno (nicméně viz úlohu 9). Dokázat trojúhelníkovou nerovnost bývá často obtížnější, viz závěrečné úlohy.

**Příklad 1.**  $M = \mathbb{R}^n$  a  $p \geq 1$  je reálné číslo. Na  $M$  definujeme metriky  $d_p(x, y)$  vztahem

$$d_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

( $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ). Pro  $n = 1$  dostáváme klasickou metriku  $|x - y|$  na  $\mathbb{R}$  a pro  $p = 2, n \geq 2$  *euklidovskou metriku*

$$d_2(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} .$$

*Euklidovskými prostory* rozumíme metrické prostory  $(\mathbb{R}^n, d_2)$  s euklidovskou metriku. Pro  $p = 1, n \geq 2$  dostáváme *poštáckou metriku*

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

a pro  $p \rightarrow \infty$  *maximovou metriku*

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| .$$

**Příklad 2.** Za  $M$  vezmeme množinu všech omezených funkcí  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  definovaných na množině  $X$ . Na  $M$  pak máme *supremovou metriku*

$$d(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)| .$$

Pokud  $M = \mathcal{C}[a, b]$  (množina reálných funkcí definovaných a spojitých na intervalu  $[a, b]$ ), supremum se nabývá a máme *maximovou metriku*

$$d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)| .$$

**Příklad 3.** Vezmeme  $M = \mathcal{C}[a, b]$  a reálné číslo  $p \geq 1$ . Podobně jako v prvním příkladu máme na  $M$  metriky

$$d_p(f, g) = \left( \int_a^b |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p} .$$

Hodnota  $p = 1$  dává *integrální metriku* a  $p \rightarrow \infty$  dává *maximovou metriku* z druhého příkladu (úloha 8). Důležitý je opět případ  $p = 2$ . Co je na exponentu  $p = 2$  zvláštního? Ukazuje se, že metrika  $d_2(\cdot, \cdot)$ , v prvním i ve třetím příkladu, je odvozena ze skalárního součinu na vektorovém prostoru, a proto má řadu pěkných a důležitých vlastností.

Vezmeme-li širší třídu funkcí  $M = \mathcal{R}[a, b]$  (funce mající na  $[a, b]$  Riemannův integrál), je  $d_p(f, g)$  definovaná, ale nespĺňuje axiom a) a nedostáváme metriku. Změníme-li totiž hodnotu funkce  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  v jediném bodě, dostaneme odlišnou funkci  $f_0 \in \mathcal{R}[a, b]$ , ale  $d_p(f, f_0) = 0$ . (Tato potíží se odstraní tak, že místo s  $\mathcal{R}[a, b]$  se pracuje s  $\mathcal{R}[a, b]/\sim$  pro vhodnou relaci ekvivalence  $\sim$ .)

**Příklad 4.** Na souvislém grafu  $G = (M, E)$  s množinou vrcholů  $M$  máme metriku

$$d(u, v) = \text{počet hran na nejkratší cestě v } G \text{ spojující } u \text{ a } v .$$

**Příklad 5.** Je-li  $A$  množina (abeceda), máme na množině  $M = A^m$  slov délky  $m$  nad abecedou  $A$  tak zvanou *Hammingovu metriku* ( $u = a_1 a_2 \dots a_m, v = b_1 b_2 \dots b_m$ )

$$d(u, v) = \text{počet souřadnic } i, \text{ pro něž } a_i \neq b_i .$$

Měří míru odlišnosti obou slov—nejmenší počet změn v písmenech postačující k přeměně  $u$  ve  $v$ .

**Příklad 6.** Na dvourozměrné sféře

$$M = S_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$$

máme metriku

$$d(x, y) = \text{délka nejkratší křivky ležící v } S_2 \text{ a spojující } x \text{ a } y .$$

Konkrétně je  $d(x, y)$  rovna délce kratšího z obou oblouků, na něž body  $x$  a  $y$  dělí hlavní kružnici  $K(x, y)$  jimi procházející.  $K(x, y)$  je průnik  $S_2$  s rovinou určenou počátkem souřadnic a body  $x$  a  $y$ . Leží-li tyto tři body na přímce ( $x$  a  $y$  jsou antipodální), není  $K(x, y)$  určena jednoznačně, ale to nic nemění na tom, že pak  $d(x, y) = \pi$ . Tuto metriku nazveme *sférickou metrikou*. Můžeme ji uvažovat i na podmnožinách  $S_2$ , například na horní polosféře

$$S_2^+ = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 \geq 0\} .$$

Dokážeme, že  $S_2^+$  se sférickou metrikou není izometrická žádné množině  $X \subset \mathbb{R}^n$  s euklidovskou metrikou. Totéž tedy platí i pro celou sféru. Sféra ani polosféra se tedy nedají „splácnout“ do roviny ani žádného jiného euklidovského prostoru se zachováním vzdáleností.

**Tvrzení (sféra není plochá).** *Když  $(S_2^+, d)$  je sférická metrika na horní polosféře a  $(X, e)$ , kde  $X \subset \mathbb{R}^n$ , je euklidovská metrika, potom neexistuje izometrie*

$$f : S_2^+ \rightarrow X .$$

*Důkaz.* Popíšeme vlastnost čtveřic bodů  $t, u, v, w \in \mathbb{R}^n$  euklidovského prostoru, která není splněna ve sférické metrice. Je vyjádřena implikací:

$$\begin{aligned} e(t, u) = e(t, v) = e(u, v) \ \& \ e(t, w) = e(w, u) = \frac{e(t, u)}{2} \\ \Rightarrow e(w, v) &= \frac{\sqrt{3} \cdot e(t, v)}{2} . \end{aligned}$$

Předpoklad implikace říká, že body  $t, u, v$  tvoří rovnostranný trojúhelník se stranou délky  $x$  a že  $w$  má od  $t$  i  $u$  vzdálenost rovnou  $x/2$ . Pro body  $t, u, w$

tak trojúhelníková nerovnost platí jako rovnost:  $e(t, u) = e(t, w) + e(w, u)$ . Podle geometrie euklidovského prostoru to znamená, že  $w$  leží na přímce procházející body  $t$  a  $u$ . Současně  $w$  leží v nadrovině těchto bodů, které mají od  $t$  i  $u$  stejnou vzdálenost. Bod  $w$  je tedy středem úsečky  $tu$ . Celá konfigurace je rovinná (všechny čtyři body leží v jedné rovině) a úsečka  $vw$  je výška spuštěná z vrcholu  $v$  na stranu  $tu$ . Její délka,  $e(v, w)$ , je (podle Pythagorovy věty)  $\sqrt{3}/2$  krát  $x$ , což přesně tvrdí závěr implikace.

Když na horní polosféře nalezneme čtyři body  $t, u, v, w \in S_2^+$  splňující předpoklad předchozí implikace, ale ne už její závěr, budeme hotovi: izometrie mezi sférickou a euklidovskou metrikou neexistuje, neboť každá izometrie ze své definice implikaci zachovává. Pro to stačí vzít body

$$t = (1, 0, 0), \quad u = (0, 1, 0), \quad v = (0, 0, 1), \quad w = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) .$$

Lehce se vidí, že skutečně  $d(t, u) = d(t, v) = d(u, v) = \pi/2$  a  $d(t, w) = d(w, u) = \frac{d(t, u)}{2} = \frac{\pi}{4}$ . Bod  $v$  je „severní pól“ a  $t, u, w$  leží na „rovníku“,  $w$  uprostřed mezi  $t$  a  $u$ . Ale všechny body na „rovníku“ (s  $x_3 = 0$ ) mají od  $v$  tutéž vzdálenost  $\pi/2$ . Tedy  $d(w, v) = d(t, v) = \pi/2 > (\sqrt{3}/2)d(t, v)$ , a závěr implikace skutečně není splněn.  $\square$

V kostce řečeno, na horní polosféře jsme našli čtyři body, jejichž šest vzájemných sférických vzdáleností nelze realizovat jako euklidovské vzdálenosti. Nestačily by na to už tři body (úloha 12)? A co když místo polosféry vezmeme jen malou sférickou oblast, kam se naše konfigurace čtyř bodů nevejde (úloha 11)?

**Příklad 7.** Položme  $M = \mathbb{Z}$  (množina celých čísel) a vezměme nějaké prvočíslo  $p$ , například  $p = 3$ . Pro  $z \in \mathbb{Z}$  jako  $\text{ord}_p(z)$  označíme největší celé číslo  $e \geq 0$  takové, že  $p^e$  dělí  $z$ ;  $\text{ord}_p(0) := +\infty$ . Na  $M$  definujeme tzv. *p-adickou metriku* ( $(1/2)^{+\infty} = 0$ )

$$d_p(x, y) = (1/2)^{\text{ord}_p(x-y)} .$$

Například, když  $p = 3$ , tak  $d_p(1, -161) = (1/2)^4 = 1/16$ , protože  $162 = 2 \cdot 3^4$ .

Dá se ukázat, že *p-adická metrika* je nejen metrika, ale splňuje dokonce toto zesílení trojúhelníkové nerovnosti:

$$d_p(x, y) \leq \max(d_p(x, z), d_p(z, y)) .$$

Metrikám splňujícím tuto silnější verzi trojúhelníkové nerovnosti se říká *ultrametriky* (nebo též *nearchimedovské metriky*). Pro jednu vlastnost ultrametrik viz úlohu 14.

Když položíme  $\|z\|_p = d_p(z, 0)$ , dostaneme tzv. *p-adickou normu*. Protože  $\text{ord}_p(z_1 z_2) = \text{ord}_p(z_1) + \text{ord}_p(z_2)$  pro každá dvě celá čísla  $z_1$  a  $z_2$ , je *p-adická norma* multiplikativní:  $\|z_1 z_2\|_p = \|z_1\|_p \cdot \|z_2\|_p$ . Trojúhelníková nerovnost přechází na nerovnost  $\|z_1 + z_2\|_p \leq \|z_1\|_p + \|z_2\|_p$ .

Obecně nazveme zobrazení

$$\|\cdot\| : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$$

*normou na okruhu celých čísel*, když (i) vždy  $\|z\| \geq 0$ ,  $\|z\| = 0 \iff z = 0$  a  $\|z\| \neq 0$  pro nějaké  $z$ , (ii)  $\|z_1 \cdot z_2\| = \|z_1\| \cdot \|z_2\|$  (multiplikativita) a (iii)  $\|z_1 + z_2\| \leq \|z_1\| + \|z_2\|$  (trojúhelníková nerovnost). Kromě *p-adické normy* je příkladem normy na celých číslech obyčejná absolutní hodnota  $\|\cdot\| = |\cdot|$ . A. Ostrowski (1893–1986) dokázal, že jiné (netriviální) normy na  $\mathbb{Z}$  nejsou. Přesně jeho věta říká následující.

**Věta (Ostrowski, 1916).** *Normy na celých číslech  $\mathbb{Z}$  jsou právě a jen jednoho z následujících tří druhů.*

1. *Triviální norma:*  $\|0\| = 0$  a  $\|z\| = 1$  pro  $z \neq 0$ .
2. *Absolutní hodnota:*  $\|z\| = |z|^c$ , kde  $c \in (0, 1]$  je konstanta.
3. *p-adická norma:*  $\|z\| = c^{\text{ord}_p(z)}$ , kde  $p$  je prvočíslo a  $c \in (0, 1)$  je konstanta.

Tuto větu dokazovat nebudeme.

## Úlohy

1. Dokažte trojúhelníkovou nerovnost pro Hammingovu metriku.
2. Dokažte trojúhelníkovou nerovnost pro grafovou metriku.
3. Ukažte, že z axiomů metrického prostoru plyne nezápornost metriky.
4. Plyne symetrie z ostatních axiomů metriky?

5. Dokažte vzorec pro maximovou metriku:  $\lim_{p \rightarrow +\infty} d_p(x, y) = d_\infty(x, y)$ .
6. Odvoďte z Cauchyovy–Schwarzovy nerovnosti ( $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ )

$$(a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + \cdots + b_n^2)$$

trojúhelníkovou nerovnost pro euklidovskou metriku. Cauchyovu–Schwarzovu nerovnost dokažte též.

7. Ověřte trojúhelníkovou nerovnost pro supremovou metriku.
8. Dokažte vzorec pro maximovou metriku pro funkce: je-li  $f$  spojitá na  $[a, b]$ , pak

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

9. Ověřte v příkladu 3 pro  $M = \mathcal{C}[a, b]$  axiom a) metrického prostoru.
10. Dokažte pro sférickou metriku trojúhelníkovou nerovnost.
11. Dokažte, že žádný sférický vrchlík (část sféry odseknutá rovinou) se sférickou metrikou není izometrický množině v  $\mathbb{R}^n$  s euklidovskou metrikou.
12. Dá se libovolný sférický trojúhelník izometricky realizovat v rovině (s euklidovskou metrikou)?
13. Ověřte, že  $p$ -adická metrika je opravdu ultrametrika.
14. Dokažte tuto neintuitivní vlastnost ultrametrického prostoru: každý trojúhelník je rovnoramenný.