

## 10. Maticové prostory

**Cv. 10.1** Buď

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Postupně nad tělesy  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Z}_5$  a  $\mathbb{Z}_7$  rozhodněte, zda platí:

- (a)  $v \in \text{Ker}(A)$ ,
- (b)  $v \in \mathcal{S}(A)$ .

**Řešení:**

Z definice jádra a sloupcového prostoru matice platí

$$\begin{aligned} \text{Ker}(A) &= \{x \in \mathbb{T}^n; Ax = 0\}, \\ \mathcal{S}(A) &= \text{span}\{A_{*1}, \dots, A_{*n}\} = \{Ax; x \in \mathbb{T}^n\}, \end{aligned}$$

stačí tedy ověřit, zda vektor  $v = (1, 2)^T$  řeší soustavu  $Ax = 0$  nad daným tělesem a zda platí  $Ax = v$  pro nějaké  $x \in \mathbb{T}^2$ .

*Nad tělesem  $\mathbb{R}$ :*

- (a) vektor  $v$  nepatří do jádra matice  $A$ , protože

$$Av = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

- (b) vektor  $v$  patří do sloupcového prostoru matice  $A$ , protože soustava

$$(A \mid v) = \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} \end{array} \right)$$

má řešení, konkrétně platí  $(1, 2)^T = \frac{3}{5}(1, 3)^T + \frac{1}{5}(2, 1)^T$ .

*Nad tělesem  $\mathbb{Z}_5$ :*

- (a) vektor  $v$  patří do  $\text{Ker}(A)$ , protože

$$Av = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

- (b) vektor  $v$  nepatří do  $\mathcal{S}(A)$ , protože soustava

$$(A \mid v) = \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

nemá nad tělesem  $\mathbb{Z}_5$  řešení.

*Nad tělesem  $\mathbb{Z}_7$ :*

- (a) vektor  $v$  nepatří  $\text{Ker}(A)$ , protože

$$Av = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

(b) vektor  $v$  patří do  $\mathcal{S}(A)$ , protože soustava

$$(A \mid v) = \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

má nad tělesem  $\mathbb{Z}_7$  řešení a platí  $(1, 2)^T = 2(1, 3)^T + 3(2, 1)^T$ .

**Cv. 10.2** Najděte báze prostorů  $\mathcal{R}(A)$ ,  $\mathcal{S}(A)$  a  $\text{Ker}(A)$  pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Řešení:**

Převodeme matici  $A$  do redukovaného odstupňovaného tvaru  $\text{RREF}(A)$ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{RREF}(A).$$

Bázi řádkového prostoru  $\mathcal{R}(A)$  tvoří (například) nenulové vektory v řádcích výsledné matice, tedy vektory  $(1, 2, 0, 1)^T$ ,  $(0, 0, 1, 1)^T$ . Důvodem je, že elementární řádkové úpravy nemění řádkový prostor matice, a tedy  $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(\text{RREF}(A))$ . Najít bázi řádkového prostoru matice  $\text{RREF}(A)$  je pak jednoduché – jsou to všechny nenulové řádky.

Bázi sloupcového prostoru můžeme vybrat z původních sloupců matice  $A$ , které odpovídají bázi sloupcům odstupňovaného tvaru. Bázi sloupců jsou první a třetí, tedy vektory  $(1, 2, 3)^T$  a  $(2, 1, 1)^T$  tvoří bázi  $\mathcal{S}(A)$ . Zdůvodnění je teď jiné, než v případě řádkového prostoru, protože elementární řádkové úpravy obecně mohou změnit sloupcový prostor matice. Co ale elementární řádkové úpravy nemění, je lineární závislost a nezávislost mezi sloupci. Tudíž můžeme tvrdit: bázi  $\mathcal{S}(\text{RREF}(A))$  tvoří první a třetí sloupec matice  $\text{RREF}(A)$ , proto bázi  $\mathcal{S}(A)$  tvoří první a třetí sloupec matice  $A$ .

Bázi jádra matice  $A$  získáme z řešení soustavy  $Ax = 0$ . Množinu všech řešení této soustavy můžeme vyjádřit pomocí nebázičkových proměnných  $x_2, x_4$  ve tvaru

$$(-2x_2 - x_4, x_2, -x_4, x_4)^T = (-2, 1, 0, 0)^T x_2 + (-1, 0, -1, 1)^T x_4.$$

Bázi  $\text{Ker}(A)$  tedy tvoří např. vektory  $(-2, 1, 0, 0)^T$ ,  $(-1, 0, -1, 1)^T$ .

**Cv. 10.3** Najděte matici  $A$  takovou, že

- (a)  $\mathcal{R}(A)$  obsahuje vektory  $(1, 1)^T$ ,  $(1, 2)^T$  a  $\mathcal{S}(A)$  obsahuje  $(1, 0, 0)^T$ ,  $(0, 0, 1)^T$ ,
- (b) bázi  $\mathcal{R}(A)$  i  $\mathcal{S}(A)$  tvoří vektor  $(1, 1, 1)^T$  a báze  $\text{Ker}(A)$  je  $(1, -2, 1)^T$ .

**Řešení:**

- (a) Tento příklad je zaměřený na kreativitu a ne na postup podle šablony. Proto popíšeme jen základní myšlenky, které pomohou hledanou matici najít. Ze zadaných vektorů v řádkovém a sloupcovém prostoru vidíme, že hledáme matici  $3 \times 2$ . Dále, z podmínek na řádkový prostor dostáváme  $\mathcal{R}(A) = \mathbb{R}^2$ , neboli stačí, aby matice  $A$  měla lineárně nezávislé sloupce. Pokud dáme vektory z podmínky na  $\mathcal{S}(A)$  přímo do sloupců matice  $A$ , získáme požadovanou matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hledaná matice ale není zdaleka jednoznačná. Požadovanou vlastnost splňují další matice, jako například

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (b) V tomto případě hledáme matici  $3 \times 3$ , pro kterou platí

$$\dim \mathcal{R}(A) = \dim \mathcal{S}(A) = \text{rank}(A) = 1, \quad \dim \text{Ker}(A) = 1.$$

Z věty o dimenzi jádra a hodnosti matice ale víme, že pro každou matici  $A \in \mathbb{T}^{m \times n}$  musí platit vztah

$$\dim \text{Ker}(A) + \text{rank}(A) = n.$$

V našem případě dostáváme  $1 + 1 = \dim \text{Ker}(A) + \text{rank}(A) = 3$ . Matice splňující požadované vlastnosti tedy neexistuje.

**Cv. 10.4** Rozhodněte, zda pro matice  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  platí

- (a)  $\mathcal{S}(A) = \mathcal{S}(B)$  implikuje  $\text{RREF}(A) = \text{RREF}(B)$ ,  
 (b)  $\text{RREF}(A) = \text{RREF}(B)$  implikuje  $\mathcal{S}(A) = \mathcal{S}(B)$ .

**Řešení:**

- (a) Tvrzení neplatí. Například matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mají stejný sloupcový prostor

$$\text{span}\{(1, 0)^T, (0, 0)^T\} = \mathcal{S}(A) = \mathcal{S}(B) = \text{span}\{(0, 0)^T, (1, 0)^T\},$$

ale jejich redukované odstupňované tvary jsou různé (obě matice jsou v RREF).

- (b) Neplatí ani tato opačná implikace. Například pro matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

máme  $\text{RREF}(A) = \text{RREF}(B) = A$ , ale přitom

$$\text{span}\{(1, 0)^T, (0, 0)^T\} = \mathcal{S}(A) \neq \mathcal{S}(B) = \text{span}\{(0, 1)^T, (0, 0)^T\}.$$

**Cv. 10.5** S využitím maticových prostorů určete dimenzi prostoru

$$V = \{x \in \mathbb{R}^n; x_1 + \dots + x_n = 0\}.$$

**Řešení:**

Prostor  $V$  odpovídá množině řešení soustavy

$$(1 \ 1 \ \dots \ 1 \mid 0),$$

to znamená jádru matice  $A = (1 \ 1 \ \dots \ 1)$ . Tato matice má rozměr  $1 \times n$  a má hodnotu 1. Pro dimenzi jádra použijeme vzoreček (věta o dimenzi jádra a hodnotě matice):

$$\dim V = \dim \text{Ker}(A) = n - \text{rank}(A) = n - 1.$$

Závěr: Hledaná dimenze je tedy  $n - 1$ .

Kdybychom chtěli najít i bázi, tak jednoduše vyřešíme soustavu  $Ax = 0$  pomocí Gaussovy eliminace. Bázi tak tvoří například vektory  $(1, -1, 0, \dots, 0)^T$ ,  $(0, 1, -1, 0, \dots, 0)^T, \dots, (0, \dots, 0, 1, -1)^T$ .

**Cv. 10.6** Z vektorů vyberte bázi prostoru  $V = \text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  a pro ostatní vektory najděte souřadnice vůči této bázi:

$$v_1 = (3, 1, 5, 4)^T, \quad v_2 = (2, 2, 3, 3)^T, \quad v_3 = (1, -1, 2, 1)^T, \quad v_4 = (1, 3, 1, 1)^T.$$

**Řešení:**

Zapíšeme jednotlivé vektory do sloupců matice  $A$ , kterou převedeme do redukovaného odstupňovaného tvaru

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{RREF}(A).$$

Připomeňme, že elementární řádkové úpravy zachovávají lineární závislost a nezávislost mezi sloupci, a to dokonce i konkrétní lineární kombinace. Tudíž z matice  $\text{RREF}(A)$  snadno vyčteme nejen bázi prostoru  $\mathcal{S}(A) = V$ , ale i hledané souřadnice.

Vidíme, že báze sloupce jsou první, druhý a čtvrtý. Bázi prostoru  $\mathcal{S}(A) = V$  tedy tvoří původní vektory  $v_1 = (3, 1, 5, 4)^T$ ,  $v_2 = (2, 2, 3, 3)^T$  a  $v_4 = (1, 3, 1, 1)^T$ .

Ze třetího sloupce upravené matice  $\text{RREF}(A)$  dostaneme souřadnice vektoru  $v_3$  vzhledem k bázi  $B = \{v_1, v_2, v_4\}$ , neboť platí

$$v_3 = (1, -1, 2, 1)^T = 1 \cdot (3, 1, 5, 4)^T + (-1) \cdot (2, 2, 3, 3)^T,$$

a tedy  $[v_3]_B = (1, -1, 0)^T$ .

**Cv. 10.7** Určete, jaký je vztah mezi prostory  $\text{Ker}(AB)$  a  $\text{Ker}(B)$  pro matice

(a)  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ,

(b)  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  regulární,  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ .

**Řešení:**

(a) Nechť  $x \in \text{Ker}(B)$ , pak z definice jádra platí  $Bx = o$ . Vektor  $x$  patří také do jádra matice  $AB$ , protože

$$(AB)x = A(Bx) = Ao = o,$$

dostaneme tedy inkluzi  $\text{Ker}(B) \subseteq \text{Ker}(AB)$ . Obrácená inkluze obecně neplatí, např. pro  $A = 0_n$  a  $B = I_n$  je vektor  $y = (1, 0, \dots, 0)^T$  v jádru matice  $AB$ , ale nikoliv v jádru matice  $B$ .

(b) Nahlédneme, že pro regulární matici  $A$  platí také inkluze  $\text{Ker}(AB) \subseteq \text{Ker}(B)$ , a tedy můžeme psát  $\text{Ker}(AB) = \text{Ker}(B)$ .

Důkaz. Nechť  $x \in \text{Ker}(AB)$ , potom  $(AB)x = o$ . Z regularity matice  $A$  existuje inverzní matice  $A^{-1}$ , pro kterou platí

$$Bx = (A^{-1}A)Bx = A^{-1}((AB)x) = A^{-1}o = o,$$

z čehož plyne  $x \in \text{Ker}(B)$ .

**Cv. 10.8** Rozhodněte, zda platí  $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$  pro  $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ .

(*Hint:* Jaký je vztah mezi prostory  $\mathcal{S}(A + B)$  a  $\mathcal{S}(A) + \mathcal{S}(B)$ ?)

**Řešení:**

Uvažujme prostor generovaný sjednocením sloupců matice  $A$  a sloupců matice  $B$ , tedy spojení  $\mathcal{S}(A) + \mathcal{S}(B)$ . Dimenze tohoto prostoru je

$$\dim(\mathcal{S}(A) + \mathcal{S}(B)) \leq \dim \mathcal{S}(A) + \dim \mathcal{S}(B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

Dále, prostor  $\mathcal{S}(A) + \mathcal{S}(B)$  obsahuje všechny vektory generované sloupci matice  $A + B$ , tedy  $\mathcal{S}(A + B)$  je podprostorem  $\mathcal{S}(A) + \mathcal{S}(B)$ . Platí proto

$$\text{rank}(A + B) = \dim \mathcal{S}(A + B) \leq \dim(\mathcal{S}(A) + \mathcal{S}(B)) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$