

Základy kombinatoriky a teorie grafů

Cvičení #8 – Vytvořující funkce

Opakování

Vytvořující funkce pro posloupnost (a_0, a_1, a_2, \dots) je mocnná řada $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$. Například $\frac{1}{1-x}$ je vytvořující funkce pro $(1, 1, \dots)$ a $(1+x)^n$ je vytvořující funkce pro $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots$ (protože pro $k > n$ platí $\binom{n}{k} = 0$). Pochopitelně, pokud $a(x)$ konverguje na nějakém okolí nuly, tak je takový přechod mezi formálními mocnnými řadami a skutečnými funkcemi legální, protože všechny členy a_i nějak odpovídají derivacím v nule. Speciálně pokud existuje K takové, že $|a_n| \leq K^n$ pro každé n , tak má $a(x)$ nenulový poloměr konvergence.

Příklady

1. Jaký koeficient má polynom $(1 + x^5 + x^7)^{20}$ u členu x^{17} ?
2. Ve zmrzlinářství prodávají 3 druhy zmrzlin — jahodovou, citronovou a čokoládovou. Kolika způsoby si můžete nechat naložit 12 kopečků, pokud od každého druhu chcete alespoň dva kopečky, ale zároveň chcete maximálně tři čokoládové kopečky? (Na pořadí kopečků nezáleží.)
3. Necht' $(a_i), (b_i)$ jsou posloupnosti, $a(x), b(x)$ jejich vytvořující funkce, $\alpha \in \mathbb{R}$ a k přirozené. Vyroberte si tabulku, jakou posloupnost vytváří funkce: $a(x) + b(x)$, $\alpha a(x)$, $a(\alpha x)$, $x^k a(x)$, $a(x^k)$, $a'(x)$, $\int_0^x a(t)dt$, $a(x)b(x)$ a $\frac{a(x) - a_0 - a_1x - \dots - a_{k-1}x^{k-1}}{x^k}$.
4. Najděte vytvořující funkce (v uzavřeném tvaru) pro následující posloupnosti: $(0, 0, -6, 6, -6, 6, -6, \dots)$, $(1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, \dots)$, $(1, 4, 9, 16, \dots)$, $(0, 2, 6, 12, 20, \dots)$ (tj. součty prvních i kladných sudých čísel).
5. Zjistěte, čemu se rovná a_n , které je zadané rekurentní rovnicí $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 4a_n$ pro $n \geq 0$.
6. Spočítejte, kolik různých dobře uzávorkovaných výrazů se dá dostat z n otevíracích a n uzavíracích závorek. (Pro $n = 2$ jsou to $()()$ a $(())$.)
7. Přirozená čísla jsme disjunktně pokryli n aritmetickými posloupnostmi s diferencemi r_1, r_2, \dots, r_n . Dokažte, že $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \dots + \frac{1}{r_n} = 1$.