

Matematická analýza 1 - Cvičení 10

Jan Soukup

25.4.2022

1 Opakování

Definice 1 (Taylorův polynom). Nechť $a \in \mathbb{R}$, nechť $n \in \mathbb{N}_0$ a nechť f je funkce definovaná na okolí a , která má v a vlastní n -tou derivaci $f^{(n)}(a) \in \mathbb{R}$. Pokud $n = 0$, předpokládejme i spojitost f v a . Taylorovým polynomem řádu n funkce f v bodě a rozumíme polynom

$$\begin{aligned} T_n^{f,a}(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i \\ &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n. \end{aligned}$$

Tvrzení 1 (Lagrangeův odhad zbytku). Nechť f je funkce, která má na otevřeném intervalu $I \subseteq \mathbb{R}$ vlastní derivaci řádu $n+1$ (a tím pádem i spojitě vlastní derivace všech nižších řádů). Volme $a, x \in I$, kde $a \neq x$. Potom existuje bod c ostře mezi a a x takový, že platí

$$R_n^{f,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \quad (1)$$

Speciálně pro $M \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $x \in I$ ležící ostře mezi body a a b platí $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, máme odhad

$$|R_n^{f,a}(b)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |b-a|^{n+1}. \quad (2)$$

Definice 2. Nechť $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ a $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ je daná funkce. Pokud má funkce $F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ na (a, b) derivaci a ta se rovná $f(x)$, tj. $F'(x) = f(x)$ pro každé $x \in (a, b)$, řekneme, že F je na intervalu (a, b) primitivní funkcí k funkci f .

Definice 3 (Linearita integrálu).

$$\int af + bg = a \int f + b \int g.$$

Definice 4 (Integrace per partes). Nechť jsou funkce f a g spojité na intervalu (a, b) a funkce F a G jsou k nim na (a, b) primitivní. Potom i funkce fG a Fg mají na (a, b) primitivní funkce a na (a, b) platí identita

$$\int f(x)G(x) dx + \int F(x)g(x) dx = F(x)G(x) + c,$$

tj. součet funkce primitivní k fG a funkce primitivní k Fg je až na aditivní konstantu roven funkci FG .

Definice 5 („Znamé primitivní funkce“).

$$(1) \int x^a = \frac{1}{a+1} x^{a+1} \text{ pro } a \neq -1$$

$$(5) \int e^x = e^x$$

$$(2) \int \frac{1}{x} = \ln(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^+ \text{ nebo } x \in \mathbb{R}^-$$

$$(6) \int \frac{1}{1+x^2} = \operatorname{arctg}(x)$$

$$(3) \int \cos(x) = \sin(x)$$

$$(4) \int \sin(x) = -\cos(x)$$

$$(7) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos(x), \quad x \in (-1, 1)$$

2 Příklady

Příklad 1. Vyšetřete průběh funkcí $x + \cos(x)$ a $\frac{2x}{1-x^2}$ nakreslete jejich grafy.

Příklad 2. Dokažte následující tvrzení:

$$(1) \forall x \in \mathbb{R}: e^x \geq 1 + x$$

Příklad 3. Napište Taylorův polynom stupně 5 se středem v nule pro následující funkce.

$$(a) f(x) = (1+x)^a$$

$$(b) f(x) = \sqrt{1+x}$$

Příklad 4. Pomocí Taylorova polynomu přibližně spočtěte následující hodnoty a odhadněte chybu.

$$(a) \cos(0,1)$$

$$(b) \sqrt{1,02}$$

$$(c) e^{0,01}$$

Příklad 5. Najdete k následujícím funkcím jejich primitivní funkce (pro danou $f(x)$ najděte $F(x)$ takovou, že $F'(x) = f(x)$).

$$(a) f(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$(b) f(x) = e^x - e^{-x}$$

$$(c) f(x) = \sin(x) + \cos(x)$$

$$(d) f(x) = x \sin(x)$$

$$(e) f(x) = x e^x$$

$$(f) f(x) = \ln(x)$$

$$(g) f(x) = x^3 e^x$$

Příklad 6 (*). S využitím Taylorového rozvoje spočtěte limitu následujících posloupností.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x(1+x)}{x^3}$$