

Cvičení 14: Proč studovat analýzu

Parciální derivace

Spočtete parciální derivace

(a) $\frac{\partial f}{\partial x}$ pro $f(x) = x^2$,

(b) $\frac{\partial f}{\partial x}$ pro $f(x, y) = x^2 + y^2$,

Gradient

Určete gradient fci

(a) $f(x, y) = x^2 - y^2$,

(b) $f(x, y) = \sin(x) \sin(y)$.

Jaká je podmínka na to, aby měla f lokální extrém?

Diferenciální rovnice

(a) Uvažujte nakažlivou nemoc, která nejde vyléčit a “dnes” jí má N lidí. Zdrojem další nákazy jsou právě nemocní lidé, tedy počet nově nakažených za nějaké časové období bude úměrný počtu právě nakažených. Určete průběh počtu nakažených v čase, tedy $N(t)$.

(b) Modifikujme předchozí model - nechtě má naše populace konečně mnoho lidí N_{tot} . Definujme procento nakažených jako

$$n = \frac{N}{N_{\text{tot}}}.$$

Počet nově nakažených lidí bude klesat, pokud nemoc mají téměř všichni, tedy bude úměrný $n(1 - n)$. Určete v téhle situaci průběh počtu nakažených jako fci času, tedy $n(t)$.

(c) Rozděleme populaci na tři kategorie

- S : susceptible, tedy ti co nemoc ještě neměli,
- I : infected, tedy ti co nemoc mají teď,
- R : removed, tedy uzdravení a umrtví.

Opět můžeme definovat procentuální hodnoty jako např. $s = \frac{S}{N}$.

Zformulujte soustavu diferenciálních rovnic pro tyto proměnné, pokud

- s klesá rychlostí úměrnou si , což je analogické minulému bodu,
- r roste úměrně počtu nakažených, neboli každý den se uzdraví nějaké procento nakažených,
- i roste úměrně si a zároveň klesá úměrně počtu nakažených.

Užitečné vztahy

Gradient

Pro fci více proměnných $f = f(x_1, \dots, x_n)$ můžeme studovat změnu její velikosti vzhledem ke každé z proměnných. Pokud budeme fixovat všechny proměnné až na k -tou, můžeme definovat parciální derivaci vzhledem ke k -té proměnné

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_k + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h},$$

kteřou můžeme též značit $\partial_k f$. Taková derivace nám říká velikost změny f , pokud změníme pouze x_k . Můžeme uvažovat vektor všech takových možných změn, kterému se říká gradient

$$\nabla f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f),$$

který nám říká takovou změnu v prostoru parametrů x_i , která způsobí největší lokální změnu f , neboli je to směr nejstrmějšího růstu f v daném bodě.

Diferenciální rovnice

Rovnice, která dává do souvislosti funkci a její derivace se označuje jako diferenciální rovnice. Danou diferenciální rovnici jde klasifikovat na základě mnoha faktorů, např.

- nejvyšší řád derivace (mluvíme o diferenciální rovnici nějakého řádu),
- pokud se zde vyskytují derivace podle jedné proměnné (tkz. obyčejné diferenciální rovnice), nebo jsou v ní parciální derivace podle více proměnných (tkz. parciální diferenciální rovnice),
- zda je hledaná fce násobená jejími proměnnými (tkz. nelineární diferenciální rovnice), nebo ne (lineární),
- ...

Řešením některých typů se dá strávit celý život.