

## Příklady ke cvičení

*Příklad 1:* V následujících úlohách vyjádřete hledaný počet jako koeficient vhodné mocniny  $x$  ve vhodném součinu mnohočlenů.

a) V cukrárně prodávají tři druhy zákusků — větrníky, kremrole a punčové dortíky. Kolika způsoby lze koupit 12 zákusků tak, aby se od každého druhu koupily alespoň dva zákusky a přitom nejvýš tři kremrole?

b) Kolika způsoby lze rozdělit 10 stejných balónků dvěma chlapečkům a dvěma holčičkám, má-li každý chlapec dostat aspoň jeden balónek a každá holčička nejméně dva?

*Příklad 2:* Vyjádřete v co nejjednodušším tvaru

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\dots(1+x^{2^k}) .$$

*Příklad 3:* Určete koeficient u příslušné mocniny  $x$  ve výrazech:

a) u  $x^{15}$  v  $(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)^4$

b) u  $x^5$  v  $(1 - 2x)^{-2}$

c) u  $x^4$  v  $(1+x)^{1/3}$

*Příklad 4:* Zjistěte, jaká posloupnost je generovaná vytvořující funkcí:

a)  $\frac{1}{\sqrt{1-2x}}$

*Příklad 5:* Ověřte, že je-li  $a(x)$  vytvořující funkce pro posloupnost  $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ , potom  $a(x)/(1-x)$  je vytvořující funkce pro posloupnost částečných součtů  $(a_0, a_0 + a_1, a_0 + a_1 + a_2, \dots)$ .

*Příklad 6:* Sestrojte vytvořující funkce pro následující posloupnosti (nepoužívejte v jejich zápisu nekonečné řady!):

a)  $(1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots)$

b)  $(0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 16, \dots, i, 2^i, \dots)$

c)  $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots)$

d)  $(1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots)$

e)  $(1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$

f)  $(1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots)$

g)  $(1, 2, 1, 4, 1, 8, \dots)$

h)  $(2, 1, 4, 3, 6, 5, \dots)$

i)  $(1, -3, 5, -7, 9, -11, \dots)$

*Příklad 7:* Nalezněte vzorec (analytické vyjádření) pro  $n$ -tý člen posloupnosti zadané pomocí rekurence:

a)  $a_0 = a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$

b)  $a_0 = a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n - 4$

c)  $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 4(a_{n+1} - a_n)$

d)  $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 4(a_{n+1} - a_n) + 1$

e)  $a_0 = 2, a_1 = 3, a_{n+2} = 3a_n - 2a_{n+1}$

f)  $a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + 1$

g)  $a_0 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 3$

h)  $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n + 2$

i)  $a_0 = a_1 = 1, 5a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$

*Příklad 8:* Sečtěte

a)  $\sum_{k=0}^n k \cdot 2^k$

b)  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$

c)  $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}^2$

d)  $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$

e)  $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$

*Příklad 9:* Sestrojte dvě šestistěnné kostky takové, že na jejich stěnách jsou napsána přirozená čísla (stejně číslo může být napsáno na více stěnách). Pravděpodobnost, že po hodu těmito dvěma kostkami padne číslo  $k$  je stejná jako při hodu standardními (poctivými) kostkami, přitom se ale o standardní kostky nejedná.

*Příklad 10:* Pro posloupnost zadanou rekurentním vztahem  $a_0 = 2, a_1 = 8, a_{n+2} = \sqrt{a_n a_{n+1}}$  určete  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

*Příklad 11:* Kolika způsoby je možné vydláždit obdélník o rozměrech  $2 \times n$  pomocí dlaždic  $1 \times 2$ ? A kolik různých způsobů dláždění stejnými dlaždicemi má obdélník o rozměrech  $3 \times n$ ? (Označte počet dláždění jako  $a_n$  a najděte rekurentní vztah a vytvořující funkci,  $a_0$  vhodně dodefinujte.)